N° 57

Observation d'une hernie Jnguinale Complette

Le nommé Duparc. Soldat au Regiment allemand de
Mandre, au Service de S.A. S. Monseigneur le Duc de
modene. agé de 26 ans, d'un temperament assez delicat,
portoit depuis six a sept ans, une hernie jnguinale —
complette, qui sortoit et rentroit sans difficulté. Le
malade n'avoit jamais usé de bandage.

Le 8. 7.bre 1749. la hernie ayant reparu, ne peut
être reduitte, il eut recours a un chirurgien de Compagnie,
qui le seigna plusieurs fois, luy apliqua les cataplasmes
emoliens qui ne relacherent point l'aneau; et il tenta —
inutillement le Taxis.

Le 16 Le malade me fut aporté presque mourant a —
L'hopital, il avoit la Phisionomie livide, le poulx tres
petit, et il vomissoit les matieres Stercoralles.

je trouvay en l'examinant une tumeur tres dure, avec une
inflamation considerable depuis l'aneau jusque au Scrotum,
qui me fit porter un tres mauvais pronostic sur la maladie,
eu egard aux accidents, et au long tems que le malade
souffroit: je determinay le malade a l'operation, qui je
fis sur le champs, en presence de M.r Layre Medecin

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 16 d. 3 n° 76 p. 1

en reputation dans cette ville, et pour lors de service al'hôpital.
j'eus beaucoup de peine a pincée la peau, ainsy qu'il se pratique
par la tention immente que l'inflamation occationoit; j'ouvrir
cependant les teguments jusque au Scrotum, et ayant
decouvert le sac herniaire, je le dissequay feuillet par feuillet,
le croyant de l'epaisseur ordinaire mais elle se trouva d'un petit
travers de doigt, ce qui allongea beaucoup l'opération. A peine
fus-je entre dans le sac, par l'ouverture que je venois d'y faire,
que les matieres Stercorales sortirent par l'incision, ce qui
me fit croire que l'intestin pouvoit s'être adheré avec le sac
par l'inflamation qui avoit precedé, je continuay
neamoins a fendre le sac haut, et bas, dans toutte sa
longueur, et je sentis dissiper ma crainte, par
L'odeur cadavereuse qui s'exhala en l'ouvrant, ce qui
manonca la gangrene de l'intestin, d'ailleurs le sac plein
d'excrements, ou se trouva un ver, me prouva évidemment
sa destruction. En effet, je trouvay six grands poulces
d'ileon gangrené, et ouvert en plusieurs endroits, et
principalement vers l'anneau, a sa partie superieure, et
posterieure le malade Couché. La pourriture s'etoit aussy
communiquée aux parties superieures, posterieures, et
Laterales du Sac. Le testicule se trouva decouvert, et j'y
reconnus cinq a six petits Kistes, remplis d'une eau

Roussatre, [illegible] formoit autant de petits hydrocelles, que jebarbai avec les cizeaux. ayant porté mon doigt dans laneau, je reconnus que l'intestin adheroit intimement ala partie superieure et lateralle interne de laneau, ce qui me determina a coupér toutte la portion — d'intestin qui formoit la hernie. J'emportay aussy les parois du sac, pour rendre les pencements plus faciles, et moins douloureux; je neus pas besoin d'assujeter les portions d'intestin, que j'avois laissé deborder hors de laneau, d'un petit travers de doigt l'étant par l'adherance. je me contantay de situer le Malade obliquement, pour empecher le tiraillement, qui pouvoit avoir lieu de la part du mezantaire, et des viceres du bas ventre. Les matieres coulerent — alors facilement par la playe il en sortit même plusieurs vers.

Je lavay la playe avec du vin chaud, trois et quatre fois par jours, et je pensai avec un digestif — animé.

La Supuration commancea a s'etablir le troizieme jour de l'operation, toutte les portions membraneuses, de la playe, et du testicule se detachoient, et malgré les excrements qui en sortoient a chaque instant, la playe devint fort belle quelques jours aprés.

Jemapercur le septieme depuis loperation, que les bouts de lintestin que javois laitté debordeé par lanneau, sexfolient, et voulant accellerer lachutte des escare en les netoyant, je pincay tout doucement la portion superieure, de lintestin qui repond a lestomac, et qui occupoit langle externe de lanneau que je trouvay detachée a mesure que je le secouai un peu, je mapercuir quil en étoit de même de la portion qui occupoit langle interne. La portion des deux bouts figuroit a peu prés deux tuyeaux dorgues, étant totalement separés lun de lautre. La Crainte que quelque mouvement du malade ne le fit rentreé dans le ventre, ce qui auroit occationé un Epanchement qui luy auroit été funeste, me jetta dans la perplex-ité sur le party que javois a prendre; Limpossibilité de les unir par la suture, a cause de linflamation quelle auroit indispentablement occationé, mempecha de la pratiqueé, et jy obvié dune autre facon.

La supuration avoit detaché ladherance quil y avoit, de la part des deux bouts de lintestin, avec lanneau, et ce qui le prouve bien clairement ce que je tiray hors du ventre, avec beaucoup de facilité, lun et lautre bout, de lintestin; atten pour les abouché

lun contre lautre, et tanter par cette voye deluy
rendre lacomunication, il meparut difficille dele:
maintenir ainsy unis, jimaginay unepetite caisse, –
capable deles attujetir alendroit deleurs embouchures,
avec unpapier plié en huit, large de deux poulces,
et long de quatres envelopé comme une lettre, avec
delabaptiste cirée, et ensuitte plié aumilieu de
chaque extremite, jusques au tiers, cequi fait –
décrire auplain dupapier, ou de son milieu, une
cavité demi courbe, capable delogér la convexité
que jay fait décrire aux deux bouts delintestin;
de façon quil setrouve apuyé dans cette cavité,
comme leseroit par comparaison mondoigt index
a demi flechy.

Jay ~~[illegible]~~ replié les quatres angles que forme
lepapier exterieurement, afin depouvoir lattujettir,
avec des bandelletes demplatres glutinatif, que japliqua
dessus et qui le croisoit en differens sens. cefut le
septieme jour de loperation que jemployay cebandage
depuis son aplication il na sorti que trespeu dexcremens
liquides, et des matieres purulantes qui suintoient –
par une echancrure, que javois fait alalevre –
inferieure de ce papier. Jen avois aussy fait une
a sa levre superieure, pour y laisser passer a –

travers de lespsit de therebentine, qui servoit de digestif alintestin.

Le troisieme jour depuis laplication de ce bandage le malade s'est a la selle par les voyes ordinaires, je crus d'abord que cetoit leffet d'un retidu dexcrem=ents dans le Colon. mais depuis ce jour qui étoit le dixieme de lopération, jl a journellement evacué par lanus. sans issue de matiere excrementitielle par la playe, ce qui me determina le quinzieme jour de lopération, et le huitieme de laplication du bandage, de lôter pour voir ce qui se passoit de la part de lintestin, je vis alors avec Etonnement quil setoit perdû dans le ventre, ce qui est cause que je nay pû fixer le tems, quil a resté dehors; D'ailleurs m'étant caché par le bandage, ou papier que javois apliqué dessus, qui lemboitoit exactem=ent. mais il n'est pas a douter, que la cicatrice s'est faitte, puis que le malade va tous les jours regulierement a la selle sans colliques, ny autres accidents. Le reste de la playe a été guery au bout de quarante jours, par les pancements ordinaires. Le Malade a peine sorty de lhopital, a été abandonné a son appetit, jl a fait avec le Regiment une longue et penible Routte, tant par mer, que par terre,

sans nulle incomodité, et jouit enfin d'une parffaitte santé. a la Ciotat Lieu de nôtre Garnison Le 1.er 9bre 1749.

Olivier de Villegrace

Monsieur Le Dran a L'original de cette observation constatée par M.r Lazre Medecin Celebre de La meme ville, en presence duquel je fis L'operation.

Académie Nationale de Médecine

Observation de Chirurgie